BON USAGE DES MÉDICAMENTS :

ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS

Saviez-vous que...

L'usage non-approprié des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) dans certaines conditions peut être dangereux pour votre santé?

Faculté de pharmacie
Université de Montréal

100 ans d'excellence

Les AINS sont commercialisés pour le soulagement de la douleur ou de la fièvre sous les noms suivants : Motrin[MD], Advil[MD] et autres produits génériques. Ils peuvent aussi être contenus dans différents produits en association avec d'autres médicaments (par exemple : Advil rhume et grippe[MD], Dristan sinus[MD], Dimetapp rhume et sinus[MD], Summit ultra[MD], Robax platine[MD] et Robaxasin[MD]).

Chez les personnes à risque, les AINS peuvent parfois causer :

- des ulcères d'estomac et parfois des saignements digestifs
- une augmentation de la pression sanguine
- une détérioration de la fonction rénale
- une poussée de maladie inflammatoire intestinale (maladie de Crohn ou colite ulcéreuse).

On retrouve aussi des AINS derrière le comptoir de la pharmacie sous le nom: Aleve[MD] (naproxène sodique) puis sous d'autres formes comme le Voltaren[MD] (diclofenac) en gel.

Il est fortement conseillé de consulter la pharmacienne ou le pharmacien avant de prendre un AINS en vente libre.

On ne devrait pas prendre un AINS pendant plus de 10 jours consécutifs sans consulter un médecin.